

Liesbreukoperatie bij kinderen

Binnenkort wordt uw kind een dag opgenomen in het TweeSteden ziekenhuis voor een liesbreukoperatie. In deze folder leest u informatie over de operatie en krijgt u een aantal richtlijnen en adviezen die bijdragen aan een snel herstel van uw kind. In de informatiefolder "Kinderdagbehandeling" leest u alles over de voorbereidingen en gang van zaken rondom de operatie van uw kind.

Wat is een liesbreuk?

Een liesbreuk bij een kind ontstaat doordat tijdens het leven in de baarmoeder de verbinding tussen de buikholte en het scrotum (balzak) zich niet sluit. Zeldzaam kan er bij meisjes ook een verbinding blijven bestaan naar de grote schaamlippen. Het buikvlies vormt dan een soort uitstulping in het lieskanaal. De breuk is herkenbaar als een zwelling ter plaatse. Het is mogelijk dat de uitstulping van het buikvlies, de breukzak, een gedeelte van de buikinhoud bevat. Bij verhoging van de druk in de buik (zoals bij staan, huilen, persen of hoesten) kan er meer buikinhoud in de uitstulping (= de breukzak) komen. De breukzak wordt dan groter.

Bij een liesbreuk bevindt de uitstulping zich in de liesstreek. Een liesbreuk verdwijnt nooit vanzelf en kan groter worden. Dat kan dan meer klachten gaan geven. Een enkele keer komt het voor dat een breuk bekneld raakt. Dan zit de breukinhoud die meestal plotseling is toegenomen, vastgeklemd in de breuk. Dat gaat gepaard met veel pijn. Een spoedoperatie is dan nodig.

De operatie

Afhankelijk van de omstandigheden wordt de operatie uitgevoerd in dagbehandeling of tijdens een kortdurende opname in het ziekenhuis. De operatie vindt plaats onder algehele anesthesie (narcose). Een liesbreukoperatie bij een kind duurt meestal een ½ uur. Via een kleine snee in de lies wordt de uitstulping van het buikvlies (= breukzak) opgezocht. De breukzak wordt dan verwijderd en het gaatje in het buikvlies wordt dichtgehecht. Meestal wordt de wond in de huid gehecht en of wordt de wond dichtgeplakt met een soort zwaluwstaartpleistertjes.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico's. Ook na een liesbreukoperatie is er een kleine kans op de complicaties die na elke operatie voor kunnen komen, zoals een nabloeding en een wondinfectie.

- In het operatiegebied lopen enkele zenuwen, bloedvaten en bij jongens ook nog de zaadstreng. Uiteraard doet de chirurg zijn uiterste best deze structuren niet te beschadigen tijdens de operatie.
- Bij een klein percentage van de geopereerde patiënten ontstaat op oudere leeftijd op dezelfde plaats opnieuw een breuk (in medische termen: een recidief). Meestal is dan weer een operatie nodig.

Na de operatie

- De wond kan de eerste dagen na de operatie enigszins opzwellen. Dit is heel normaal.
- Na de operatie zit er een pleister op de wond. Deze kunt u het beste 2 dagen laten zitten. Daarna mag de pleister verwijderd worden; er hoeft dan waarschijnlijk geen nieuwe pleister op, maar dit mag natuurlijk wel.
- Tot de eerste controle mag uw kind alleen douchen. Na het douchen moet u de wond voorzichtig droogdeppen. Uw kind mag niet in bad of zwemmen in verband met het week worden van de wond.
- Als uw kind pijn heeft, mag uw kind paracetamol hebben. Er moet steeds minimaal 4 uur tussen elke keer dat uw kind paracetamol krijgt zitten.
- Houdt uw kind een paar dagen thuis.
- Tot de controle afspraak op de polikliniek mag uw kind niet sporten.

Heeft u nog vragen?

Vóór de operatie

- Bij medische vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek chirurgie.
- Bij vragen over de verdoving tijdens de operatie kunt u contact opnemen met de polikliniek anesthesiologie.
- Als uw kind voor het afgesproken onderzoek of ingreep is verhinderd, verzoeken wij u het opnamebureau daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. In de plaats van uw kind kan dan iemand anders worden geholpen.
- Wanneer uw kind koorts heeft, kan de behandeling niet plaatsvinden. Als u twijfelt of uw kind geholpen kunt worden, neem dan contact op met de kinderdagbehandeling, kinderafdeling of de polikliniek chirurgie.

Na de operatie

Wanneer zich thuis na de operatie bij uw kind (acute) problemen voordoen, kunt u contact opnemen:

- met uw huisarts of de huisartsenpost;
- met de kinderafdeling;
- met de polikliniek chirurgie;
- buiten kantooruren met de spoedeisende hulp.

Belangrijke telefoonnummers

Polikliniek chirurgie Waalwijk (Route poli Noord)	0416-682708
Polikliniek chirurgie Tilburg (Route 72)	013-4655580
Polikliniek anesthesiologie Waalwijk (Route poli Noord)	0416-682732
Polikliniek anesthesiologie Tilburg (Route 88)	013-4655171
Kinderdagbehandeling Tilburg (Route 89, 1 ^e verdieping)	013-4655387
Kinderafdeling Tilburg (2A, 2 ^e verdieping)	013-4655387
Opnamebureau Waalwijk (Centrale hal)	0416-682350
Opnamebureau Tilburg (Route 19)	013-4655880
Spoedeisende Hulp (alléén Tilburg)	013-4655216