

Naar huis met een drain

De inhoud van deze folder komt uit onze Patient Journey App. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis.

Welkom

Welkom!



Welkom in deze app. U kunt hier meer informatie vinden over Naar huis met een drain.

Gebruikt u MijnETZ al?



Hiermee kunt u veilig digitaal meekijken in uw eigen patiëntendossier.

Ons team



Uw behandeling wordt uitgevoerd door een plastisch chirurg. Via onderstaande link kunt u alle plastisch chirurgen zien werkzaam in het ETZ.

Wat is een drain?

Wat is een drain?



Een drain is een slang(etje) in het wondgebied. Dit slangetje is vastgezet met een hechting en een pleister.

Meer informatie over: Wat is een drain?

De fles die aan de drain zit, is vacuüm, waardoor er zuigkracht ontstaat om overtollig vocht af te zuigen. De fles is van doorzichtig materiaal, zodat het vocht zichtbaar is.

Aan de groene harmonicadop boven op de fles is te zien of de drain nog vacuüm is. Wanneer deze ingedrukt staat, is de drain vacuüm en zuigt het vocht dus af. Als de dop uitgerekt is, dan is het vacuüm er af en moet dus een nieuwe fles aangesloten worden, tenzij afgesproken is dat er geen vacuüm nodig is.

Verzorging van de wond met drain

Verzorging van de wond met de drain

De drain is vastgehecht, deze blijft daarom goed op zijn plaats zitten. Als u het prettiger vindt, kan er een gaasje om de drain insteekplaats gelegd worden.

Meer informatie over: Verzorging van de wond met de drain

U mag met de drain **niet** onder de douche.

De wond en de insteekopening van de drain kunnen na de operatie rood zien en een beetje gezwollen zijn. Dit is een normale reactie. Controleer dagelijks de wond op roodheid, zwelling, vochtverlies en pijn. Als deze klachten optreden en/of wanneer u koorts krijgt, wordt u verzocht contact op te nemen met het ziekenhuis, bij voorkeur via de polikliniek (zie belangrijke telefoonnummers).

De wond hoeft niet verbonden te worden als deze droog is. Als de wond vochtig is, kunt u er een gaasje op doen.

Omgaan met de drain

Omgaan met de drain

U kunt de fles in een tasje met u meedragen. Dit is prettig omdat u dan beide handen vrij heeft en de fles niet kunt vergeten wanneer u plotseling opstaat. Bekijk een aantal keren per dag (3 à 4 keer) of de opvangpot nog vacuüm is.

Mogelijke problemen thuis

Mogelijke problemen thuis

Lees verder over alle mogelijke problemen bij het hebben van een drain.

Meer informatie over: Mogelijke problemen thuis

- **De opvangpot is niet meer vacuüm** (tenzij dit is afgesproken en er geen vacuüm nodig is)
- **Het slangetje is losgeschoten** Als het slangetje is losgeschoten, gaat het vacuüm van de opvangpot af, dit gebeurt vaak met een sissend geluid.
- **Het slangetje zit verstopt** Het wondvocht komt langs de insteekopening van de drain naar buiten of hoopt zich op onder de huid. Leg een absorberend verband onder de drain bij de insteekopening. Neem vervolgens contact op met het ziekenhuis.
- **De opvangpot zit vol**

Meest gestelde vragen met antwoorden

Kan het kwaad als er meer dan 100 ml wondvocht per 24 uur wordt geproduceerd?



Als dit gebeurt, moet u contact opnemen voor overleg met het ziekenhuis.

De kleur van het vocht wordt doorzichtig in plaats van rood, kan dit kwaad?



Nee, dit is normaal. De wond produceert nu minder bloed.

Wat kan ik doen bij pijn?



4x daags 2 tabletten paracetamol 500 mg, eventueel extra medicatie in overleg met de arts.

Het verwijderen van de drain

Het verwijderen van de drain

De drain wordt verwijderd als er minder dan 30 cc wondvocht per 24 uur afloopt. Het verwijderen vindt plaats op de polikliniek Plastische Chirurgie.

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis?

Wanneer moet u contact opnemen met het ziekenhuis?



- Als de drain plotseling veel meer afloopt dan in een zelfde periode daarvoor.
- Als de drain er toch uitvalt.
- Als u plotseling veel pijn heeft en een pijnstiller niet meer helpt.
- Als u meer dan 38.5°C koorts krijgt

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?



Als u door ziekte of een andere reden niet kunt komen, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie. U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken. In uw plaats kan een andere patiënt geholpen worden.