

## Huidtest insect (bij-wesp)

De inhoud van deze folder komt uit de Patient Journey App. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis. Doorloop de volgende stappen om de app in gebruik te nemen:



- 1 Zoek naar Patient Journey in de App Store / Google Play of scan de QR code.
- 2 Download de app
- 3 Accepteer de push notificaties
- 4 Zoek naar ETZ behandelwijzer
- 5 Selecteer de juiste behandeling en druk op 'Start'.

## Welkom

---

### Huidtest insect (bij-wesp)

Deze test wordt toegepast om te testen of mensen allergisch zijn voor een bij, en/of een wesp.

## Vorbereiding

---

### Medicatie



Om de testen goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u/uw kind met de inname van antiallergische tabletten (tenminste) 4 dagen voor de test stopt.

### Goed om te weten!



Het is niet nodig om nuchter te komen voor de test, het wordt aanbevolen juist wel te ontbijten.

## Uitvoering

---

### Waar mag u zich melden?



U mag zich melden op het Allergiecentrum, ETZ Elisabeth, route 35.

## Huidtest insect

Deze test wordt stapsgewijs uitgevoerd: er wordt met een heel lage concentratie begonnen en als er na 15 minuten geen reactie zichtbaar is op het allergeen, testen we met een hogere concentratie.

## Uitslag

---

### Na de test



Na deze 15 minuten zal de assistente de huidtest aflezen. Bij grote reacties of heftige jeuk kan eventueel een antiallergisch tabletje gegeven worden. In sommige gevallen wordt de huid met zalf ingesmeerd.

## Contact

---

### Contact



Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Allergiecentrum.  
Heeft u een ernstige allergische reactie na 17:00 uur, neem dan contact op met huisarts of huisartsenpost.

### Meer informatie over: Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Allergiecentrum.

#### **ETZ Elisabeth**

#### **Direct nummer**

(013) 221 00 20

#### **Openingstijden**

ma t/m vrij 8.30-17.00

#### **Route**

35

## Antiallergische medicatie

Om de testen goed te kunnen beoordelen is het heel belangrijk dat u/uw kind de inname van de volgende medicijnen 4 dagen voor de test stopt:

### Tabletten

Algemene naam	Merksnaam
Acrivastine	Semprex <sup>o</sup>
Alimemazine	Nedeltran <sup>o</sup>
Cetirizine	Zyrtec <sup>o</sup> , Reactine <sup>o</sup> , Revalintabs <sup>o</sup>
Chloorcyclizine/cinnarizine	Primatour <sup>o</sup>
Cimetidine	Tagamet <sup>o</sup>
Cinnarizine	
Clemastine	Tavegil <sup>o</sup>
Cromoglicinezuur	Nalcrom <sup>o</sup>
Cyclizine	
Cyproheptadine	Periactin <sup>o</sup>
Desloratadine	Aerius <sup>o</sup>
Dexchlorfeniramine	Polaramine <sup>o</sup>
Dimenhydrinaat	
Dimetindeen	Fenistil <sup>o</sup>
Ebastine	Kestine <sup>o</sup>
Famotidine	Pepcid <sup>o</sup> , Pepcidin <sup>o</sup>
Fexofenadine	
Guaifenesine/natriumbenzoesaat/oxomemazine	Toplexil <sup>o</sup>
Hydroxyzine	Atarax <sup>o</sup>
Ketotifen	Zaditen <sup>o</sup>
Levocetirizine	Xyzal <sup>o</sup>
Loratadine	Allerfre <sup>o</sup> , Claritine <sup>o</sup>
Mebhydroline	
Meclozine	Suprimal <sup>o</sup>
Meclozine/pyridoxine	Emesafene <sup>o</sup>
Mizolastine	Mizollen <sup>o</sup>
Montelukast	Singulair <sup>o</sup>
Nizatidine	Axid <sup>o</sup>
Oxatomide	Tinset <sup>o</sup>
Oxomemazine	Toplexil <sup>o</sup>
Promethazine	
Ranitidine	Zantac <sup>o</sup>
Ranitidinebismutcitraat	Pylorid <sup>o</sup>
Terfenadine	Triludan <sup>o</sup>