

De inhoud van deze folder komt uit de Patient Journey App. Daarom kan het zijn dat sommige verwijzingen in deze folder niet juist zijn omdat zij naar een mogelijkheid in de app verwijzen. Om de informatie zo goed mogelijk te kunnen bekijken is het downloaden van onze app via de app store of google play store aan te raden. Deze app is gratis. Doorloop de volgende stappen om de app in gebruik te nemen:

- 1 Zoek naar Patient Journey in de App Store / Google Play of scan de QR code.
- 2 Download de app
- 3 Accepteer de push notificaties
- 4 Zoek naar ETZ behandelwijzer
- 5 Selecteer de juiste behandeling en druk op 'Start'.

Welkom

Ijsblokjestest



Bij deze test wordt onderzocht of u een huidreactie krijgt van de kou.

Vorbereiding

Zalven



Het smeren van zalven met corticosteroid moet u 1 week vòòr de test stoppen. U mag dan nog wel uzelf insmeren met zalven zonder corticosteroid, zoals bodylotion, alleen niet op de armen en de rug de dag van de test.

Medicatie

Om de testen goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u/uw kind met de inname van antiallergische tabletten (ten minste) 4 dagen voor de test stopt.

Meer informatie over: Medicatie

Om de testen goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u/uw kind met de inname van antiallergische medicijnen (tenminste) 4 dagen voor de test stopt. Gebruikt u Bètablokkers of antidepressiva? Klik dan op de onderstaande button voor belangrijke informatie.

Antidepressiva

Een aantal antidepressiva kunnen een remmende werking hebben op de test. Als u antidepressiva gebruikt moet u vooraf dit aan de allergoloog doorgeven. U mag nooit zonder overleg stoppen met deze medicatie.

Anti-allergische medicatie



Zie afbeelding voor een overzicht van anti-allergische medicatie

Goed om te weten!



Het is niet nodig om nuchter te komen voor de test, het wordt aanbevolen juist wel te ontbijten!

Uitvoering

Ijsblokjestest



Gedurende vijf minuten leggen we een plastic zak met ijs op de huid van uw arm. Na enkele minuten wordt de reactie van uw huid beoordeeld. Roodheid is normaal, een zwellig of bultjes duidt op een reactie van uw huid. Na tien minuten, zonder ijs, wordt uw huid nogmaals beoordeeld.

Na de ijsblokjestest

Na de ijsblokjestest

Krijgt u een reactie? Dan moet u dit direct melden bij de polikliniek assistente. Daarom is het van belang dat u/uw kind na de test altijd nog 15 minuten blijft wachten. Voelt u/uw kind zich na dit kwartier goed en hebt u geen verdere afspraken dan kunt u vervolgens naar huis.

Contact

Contact



Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Allergiecentrum.

Meer informatie over: Contact

ETZ Elisabeth

Direct nummer

(013) 221 00 20

Antiallergische medicatie

Om de testen goed te kunnen beoordelen is het heel belangrijk dat u/uw kind de inname van de volgende medicijnen 4 dagen voor de test stopt:

Tabletten

Algemene naam	Merksnaam
Acrivastine	Semprex ^o
Alimemazine	Nedeltran ^o
Cetirizine	Zyrtec ^o , Reactine ^o , Revalintabs ^o
Chloorcyclizine/cinnarizine	Primatour ^o
Cimetidine	Tagamet ^o
Cinnarizine	
Clemastine	Tavegil ^o
Cromoglicinezuur	Nalcrom ^o
Cyclizine	
Cyproheptadine	Periactin ^o
Desloratadine	Aerius ^o
Dexchlorfeniramine	Polaramine ^o
Dimenhydrinaat	
Dimetindeen	Fenistil ^o
Ebastine	Kestine ^o
Famotidine	Pepcid ^o , Pepcidin ^o
Fexofenadine	
Guaifenesine/natriumbenzoesaat/oxomemazine	Toplexil ^o
Hydroxyzine	Atarax ^o
Ketotifen	Zaditen ^o
Levocetirizine	Xyzal ^o
Loratadine	Allerfre ^o , Claritine ^o
Mebhydroline	
Meclozine	Suprimal ^o
Meclozine/pyridoxine	Emesafene ^o
Mizolastine	Mizollen ^o
Montelukast	Singulair ^o
Nizatidine	Axid ^o
Oxatomide	Tinset ^o
Oxomemazine	Toplexil ^o
Promethazine	
Ranitidine	Zantac ^o
Ranitidinebismutcitraat	Pylorid ^o
Terfenadine	Triludan ^o

Om de testen goed te kunnen beoordelen is het belangrijk dat u/uw kind met de inname van antiallergische medicijnen (tenminste) 4 dagen voor de test stopt. Gebruikt u Bètablokkers of antidepressiva? Klik dan op de onderstaande button voor belangrijke informatie.

Antidepressiva

Een aantal antidepressiva kunnen een remmende werking hebben op de test. Als u antidepressiva gebruikt moet u vooraf dit aan de allergoloog doorgeven. U mag nooit zonder overleg stoppen met deze medicatie.

Anti-allergische medicatie

Antiallergische medicatie

Om de testen goed te kunnen beoordelen is het heel belangrijk dat u/uw kind de inname van de volgende medicijnen 4 dagen voor de test stopt:

Tabletten

Algemene naam	Merknaam
Acrivastine	Semprex ^o
Alimemazine	Nedeltran ^o
Cetirizine	Zyrtec ^o , Reactine ^o , Revalintabs ^o
Chloorcyclizine/cinnarizine	Primatour ^o
Cimetidine	Tagamet ^o
Cinnarizine	
Clemastine	Tavegil ^o
Cromoglicinezuur	Nalcrom ^o
Cyclizine	
Cyproheptadine	Periactin ^o
Desloratadine	Aerius ^o
Dexchlorfeniramine	Polaramine ^o
Dimenhydrinaat	
Dimetindeen	Fenistil ^o
Ebastine	Kestine ^o
Famotidine	Pepcid ^o , Pepcidin ^o
Fexofenadine	
Guaifenesine/natriumbenzoaat/oxomemazine	Toplexil ^o
Hydroxyzine	Atarax ^o
Ketotifen	Zaditen ^o
Levocetirizine	Xyzal ^o
Loratadine	Allerfre ^o , Claritine ^o
Mebhydroline	
Meclozine	Suprimal ^o
Meclozine/pyridoxine	Emesafene ^o
Mizolastine	Mizollen ^o
Montelukast	Singulair ^o
Nizatidine	Axid ^o
Oxatomide	Tinset ^o
Oxomemazine	Toplexil ^o
Promethazine	
Ranitidine	Zantac ^o
Ranitidinebismutcitraat	Pylorid ^o
Terfenadine	Triludan ^o